



# La esfera emocional y social

# del cáncer de pulmón

**ANEXO II**

**Datos del análisis bivariado**

**Informe completo en páginas web**

[www.fundacionmasqueideas.org](http://www.fundacionmasqueideas.org) [www.afectadoscancerdepulmon.com](http://www.afectadoscancerdepulmon.com)

1. Datos categorizados por área afectada por la enfermedad (pag. 2)
2. Datos de acceso a profesionales (pag. 3)
3. Datos categorizados por síntoma o efecto secundario (pag. 4)
4. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Género" (pag. 7)
5. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Edad" (pag. 15)
6. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Residir en capital o no capital de provincia" (pag. 18)
7. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Tamaño de municipio de residencia" (pag. 20)
8. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Nivel educativo" (pag. 27)
9. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Fase de la enfermedad" (pag. 34)
10. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Haber o no fumado" (pag. 41)

## 1. Datos categorizados por área afectada por la enfermedad

### Vida cotidiana (aficiones, amistades, responsabilidades...)

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	,00	30	14,2	17,4
	1,00	20	9,3	28,8
	2,00	21	9,7	40,7
Válidos	3,00	37	17,4	62,1
	4,00	29	13,6	78,8
	5,00	36	17,3	100,0
Total	172	81,5	100,0	
Perdidos Sistema	39	18,5		
Total	211	100,0		

### Estado de ánimo / emocional / psicológico

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	,00	11	5,4	6,6
	1,00	19	9,0	17,6
	2,00	26	12,1	32,4
Válidos	3,00	47	22,3	59,8
	4,00	29	13,9	76,9
	5,00	40	18,9	100,0
Total	172	81,5	100,0	
Perdidos Sistema	39	18,5		
Total	211	100,0		

### Planes de futuro

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	,00	23	10,7	13,3
	1,00	11	5,4	20,0
	2,00	17	7,9	29,9
Válidos	3,00	32	15,0	48,6
	4,00	29	13,6	65,5
	5,00	58	27,7	100,0
Total	170	80,3	100,0	
Perdidos Sistema	42	19,7		
Total	211	100,0		

### Familia (relaciones, roles, dinámicas, etc.)

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	,00	63	30,0	37,2
	1,00	13	6,1	44,7
	2,00	17	8,2	54,8
Válidos	3,00	30	14,4	72,7
	4,00	18	8,7	83,5
	5,00	28	13,3	100,0
Total	171	80,8	100,0	
Perdidos Sistema	41	19,2		
Total	211	100,0		

## 2. Datos de acceso a profesionales

	Nº	Porcentaje de casos
Oncólogo/a médico/a	119	87,3%
Oncólogo/a radioterápico	65	47,8%
Cirujano/a	57	42,0%
Enfermero/a hospitalario	83	61,0%
Enfermero/a de Atención Primaria	31	22,6%
Médico/a de Atención Primaria	73	54,0%
Neumólogo/a	77	56,7%
Nutricionista/a	16	11,9%
Fisioterapeuta / Rehabilitador	14	10,1%
Psiquiatra	10	7,4%
Abogado/a	2	1,1%
Psicólogo/a	29	21,3%
Trabajador/a social	10	7,3%
Equipo de cuidados paliativos	13	9,8%
Otro	9	6,4%
Total	608	446,8%

### 3.. Datos categorizados por síntoma o efecto secundario

Dolor	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje
	a	válido	acumulado
No lo he sufrido	45	23,6	23,6
Me ha afectado poco	25	13,0	36,6
Me ha afectado moderadamente	62	32,7	69,3
Me ha afectado mucho	58	30,7	100,0
Total	190	100,0	

Cansancio / fatiga	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje
	a	válido	acumulado
No lo he sufrido	10	5,1	5,1
Me ha afectado poco	23	11,5	16,7
Me ha afectado moderadamente	78	40,0	56,7
Me ha afectado mucho	85	43,3	100,0
Total	196	100,0	

Fiebre	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje
	a	válido	acumulado
No lo he sufrido	118	62,5	62,5
Me ha afectado poco	37	19,7	82,2
Me ha afectado moderadamente	27	14,5	96,6
Me ha afectado mucho	6	3,4	100,0
Total	189	100,0	

Tos	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje
	o	válido	acumulado
No lo he sufrido	58	30,0	30,0
Me ha afectado poco	56	29,0	59,0
Me ha afectado moderadamente	53	27,4	86,5
Me ha afectado mucho	26	13,5	100,0
Total	194	100,0	

Dificultad al respirar	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje
	o	válido	acumulado
No lo he sufrido	54	28,0	28,0
Me ha afectado poco	49	25,2	53,3
Me ha afectado moderadamente	56	28,9	82,1
Me ha afectado mucho	35	17,9	100,0
Total	194	100,0	

Dificultad al tragar	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje
	o	válido	acumulado
No lo he sufrido	103	53,9	53,9
Me ha afectado poco	42	21,8	75,7
Me ha afectado moderadamente	33	17,5	93,2
Me ha afectado mucho	13	6,8	100,0
Total	191	100,0	

<b>Pérdida del cabello</b>			
	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No lo he sufrido	77	40,1	40,1
Me ha afectado poco	37	19,2	59,2
Me ha afectado moderadamente	38	19,9	79,2
Me ha afectado mucho	40	20,8	100,0
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100,0</b>	

<b>Pérdida / aumento de peso</b>			
	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No lo he sufrido	37	19,3	19,3
Me ha afectado poco	50	26,1	45,4
Me ha afectado moderadamente	61	31,9	77,2
Me ha afectado mucho	44	22,8	100,0
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100,0</b>	

<b>Vómitos</b>			
	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No lo he sufrido	115	60,5	60,5
Me ha afectado poco	33	17,2	77,8
Me ha afectado moderadamente	27	14,4	92,2
Me ha afectado mucho	15	7,8	100,0
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>100,0</b>	

<b>Hormigueo de manos y/o pies</b>			
	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No lo he sufrido	56	29,4	29,4
Me ha afectado poco	50	26,2	55,5
Me ha afectado moderadamente	54	28,7	84,3
Me ha afectado mucho	30	15,7	100,0
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100,0</b>	

<b>Pérdida de apetito</b>			
	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No lo he sufrido	65	34,5	34,5
Me ha afectado poco	57	30,4	64,9
Me ha afectado moderadamente	35	18,8	83,7
Me ha afectado mucho	31	16,3	100,0
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100,0</b>	

<b>Calambres</b>			
	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No lo he sufrido	85	44,8	44,8
Me ha afectado poco	53	28,1	72,9
Me ha afectado moderadamente	42	22,3	95,2
Me ha afectado mucho	9	4,8	100,0
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100,0</b>	

<b>Mareos</b>		Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo he sufrido	86	46,4	46,4
	Me ha afectado poco	48	25,7	72,1
	Me ha afectado moderadamente	37	19,8	91,9
	Me ha afectado mucho	15	8,1	100,0
	Total	185	100,0	

<b>Problemas en la piel</b>		Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo he sufrido	59	31,0	31,0
	Me ha afectado poco	63	33,1	64,1
	Me ha afectado moderadamente	48	25,3	89,4
	Me ha afectado mucho	20	10,6	100,0
	Total	190	100,0	

<b>Reacciones alérgicas</b>		Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo he sufrido	123	66,4	66,4
	Me ha afectado poco	43	23,0	89,4
	Me ha afectado moderadamente	13	7,2	96,6
	Me ha afectado mucho	6	3,4	100,0
	Total	185	100,0	

<b>Rotura de uñas</b>		Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo he sufrido	113	60,9	60,9
	Me ha afectado poco	38	20,2	81,1
	Me ha afectado moderadamente	25	13,6	94,8
	Me ha afectado mucho	10	5,2	100,0
	Total	186	100,0	

<b>Ronquera u otras alteraciones de la voz</b>		Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo he sufrido	82	43,5	43,5
	Me ha afectado poco	56	29,8	73,2
	Me ha afectado moderadamente	30	16,0	89,2
	Me ha afectado mucho	20	10,8	100,0
	Total	188	100,0	

#### 4. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Género"

##### Áreas afectadas por la enfermedad

	Género	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Familia (relaciones, roles, dinámicas, etc.)	Mujer	51	2,1683	1,86969	,26195
	Hombre	119	2,0282	1,95088	,17915
Estado de ánimo / emocional / psicológico	Mujer	51	3,2574	1,52841	,21414
	Hombre	120	2,9861	1,51085	,13777
Planes de futuro	Mujer	50	3,5960	1,51215	,21399
	Hombre	119	3,0563	1,83003	,16805
Vida cotidiana (aficiones, amistades, responsabilidades, etc.)	Mujer	51	2,8812	1,59079	,22288
	Hombre	120	2,6528	1,83460	,16730

##### Síntomas y efectos secundarios

		Género			
		Mujer		Hombre	
		Recuento	% del N de la columna	Recuento	% del N de la columna
Dolor	No lo he sufrido	13	23,0%	32	24,1%
	Me ha afectado poco	10	16,8%	15	11,4%
	Me ha afectado moderadamente	18	31,0%	43	32,9%
	Me ha afectado mucho	17	29,2%	42	31,6%
Cansancio / fatiga	No lo he sufrido	4	6,9%	5	3,7%
	Me ha afectado poco	8	12,9%	15	11,1%
	Me ha afectado moderadamente	18	31,0%	60	44,4%
	Me ha afectado mucho	29	49,1%	55	40,7%
Fiebre	No lo he sufrido	38	66,1%	79	61,0%
	Me ha afectado poco	11	19,1%	25	19,5%
	Me ha afectado moderadamente	6	9,6%	22	16,9%
	Me ha afectado mucho	3	5,2%	3	2,6%
Tos	No lo he sufrido	17	29,3%	40	30,0%
	Me ha afectado poco	15	25,0%	42	31,2%
	Me ha afectado moderadamente	17	29,3%	35	26,2%
	Me ha afectado mucho	10	16,4%	17	12,5%

Dificultad al respirar	No lo he sufrido	18	31,3%	35	26,2%
	Me ha afectado poco	16	27,8%	32	23,7%
	Me ha afectado moderadamente	14	24,3%	42	31,2%
	Me ha afectado mucho	10	16,5%	25	18,7%
Dificultad al tragar	No lo he sufrido	31	52,6%	70	53,8%
	Me ha afectado poco	13	22,4%	28	21,8%
	Me ha afectado moderadamente	10	17,2%	23	17,9%
	Me ha afectado mucho	5	7,8%	8	6,4%
Pérdida del cabello	No lo he sufrido	20	35,1%	57	42,5%
	Me ha afectado poco	10	17,5%	27	20,0%
	Me ha afectado moderadamente	12	20,2%	27	20,0%
	Me ha afectado mucho	16	27,2%	23	17,5%
Vómitos	No lo he sufrido	31	53,5%	84	63,3%
	Me ha afectado poco	11	19,3%	22	16,5%
	Me ha afectado moderadamente	9	15,8%	18	13,9%
	Me ha afectado mucho	7	11,4%	8	6,3%
Pérdida de apetito	No lo he sufrido	19	34,2%	45	34,2%
	Me ha afectado poco	16	27,9%	42	31,6%
	Me ha afectado moderadamente	12	21,6%	23	17,7%
	Me ha afectado mucho	9	16,2%	22	16,5%
Pérdida / aumento de peso	No lo he sufrido	7	12,3%	30	22,5%
	Me ha afectado poco	17	28,9%	33	25,0%
	Me ha afectado moderadamente	16	28,1%	45	33,7%
	Me ha afectado mucho	18	30,7%	25	18,7%
Hormigueo de manos y/o pies	No lo he sufrido	16	27,8%	38	29,5%
	Me ha afectado poco	16	27,8%	33	25,6%
	Me ha afectado moderadamente	18	30,4%	37	28,2%
	Me ha afectado mucho	8	13,9%	22	16,7%
Calambres	No lo he sufrido	27	46,5%	57	43,6%
	Me ha afectado poco	15	25,4%	38	29,5%
	Me ha afectado moderadamente	12	21,1%	30	23,1%
	Me ha afectado mucho	4	7,0%	5	3,8%
Mareos	No lo he sufrido	26	45,1%	60	47,4%
	Me ha afectado poco	13	23,0%	33	26,3%

	Me ha afectado moderadamente	12	20,4%	25	19,7%
	Me ha afectado mucho	7	11,5%	8	6,6%
Problemas en la piel	No lo he sufrido	17	29,6%	42	31,6%
	Me ha afectado poco	16	27,8%	47	35,4%
	Me ha afectado moderadamente	15	25,2%	33	25,3%
	Me ha afectado mucho	10	17,4%	10	7,6%
Reacciones alérgicas	No lo he sufrido	33	59,1%	90	70,1%
	Me ha afectado poco	13	23,6%	28	22,1%
	Me ha afectado moderadamente	7	11,8%	7	5,2%
	Me ha afectado mucho	3	5,5%	3	2,6%
Rotura de uñas	No lo he sufrido	25	45,0%	87	67,5%
	Me ha afectado poco	14	25,2%	23	18,2%
	Me ha afectado moderadamente	9	15,3%	17	13,0%
	Me ha afectado mucho	8	14,4%	2	1,3%
Ronquera u otras alteraciones de la voz	No lo he sufrido	26	45,1%	55	42,3%
	Me ha afectado poco	13	22,1%	43	33,3%
	Me ha afectado moderadamente	10	17,7%	20	15,4%
	Me ha afectado mucho	9	15,0%	12	9,0%

## Dificultades de tipo funcional

			Cosas que no puede hacer solo/a <sup>a</sup>							Total	
			Aseo (lavarse, ducharse, etc.)	Hacer las tareas del hogar	Viajar	Dormir y descansar	Recordar o concentrarme	Realizar la alimentación habitual	Hacer ejercicio físico		Puedo hacer todas las actividades sin ayuda
Género	Mujer	Recuento	7	21	13	13	13	8	22	20	116
		% dentro de v1	5,7%	17,9%	10,9%	11,4%	11,4%	6,6%	18,8%	17,5%	
	Hombre	Recuento	12	33	32	12	20	8	45	68	230
		% dentro de v1	5,1%	14,5%	13,8%	5,1%	8,7%	3,6%	19,6%	29,7%	
Total		Recuento	18	54	44	25	33	16	67	89	346

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

## Repercusiones emocionales

		Mujer		Hombre	
		Recuento	% del N	Recuento	% del N
Preocupación por mi familia	Sí, con mucha frecuencia	32	62,4%	60	50,0%
	Sí, en más ocasiones	16	31,7%	50	41,7%
	No	3	5,9%	10	8,3%
Sentimiento de soledad	Sí, con mucha frecuencia	14	26,7%	15	12,5%
	Sí, en más ocasiones	18	34,7%	38	31,9%
	No	20	38,6%	67	55,6%
Miedo relacionado con la enfermedad	Sí, con mucha frecuencia	28	54,5%	55	45,8%
	Sí, en más ocasiones	18	35,6%	43	36,1%
	No	5	9,9%	22	18,1%
Ansiedad y estrés	Sí, con mucha frecuencia	22	43,6%	37	30,6%
	Sí, en más ocasiones	19	37,6%	50	41,7%
	No	10	18,8%	33	27,8%
Sensación de bloqueo	Sí, con mucha frecuencia	16	30,7%	23	19,4%
	Sí, en más ocasiones	21	41,6%	48	40,3%
	No	14	27,7%	48	40,3%
Sentimiento de culpabilidad	Sí, con mucha frecuencia	9	16,8%	18	15,3%
	Sí, en más ocasiones	13	24,8%	18	15,3%
	No	30	58,4%	84	69,4%
Sensación de que me juzgan	Sí, con mucha frecuencia	9	17,0%	3	2,8%
	Sí, en más ocasiones	10	20,0%	15	12,5%
	No	32	63,0%	102	84,7%
Preocupación por mi imagen física	Sí, con mucha frecuencia	14	27,0%	5	4,3%
	Sí, en más ocasiones	19	37,0%	38	32,9%
	No	18	36,0%	73	62,9%
Vergüenza por tener la enfermedad	Sí, con mucha frecuencia	5	8,9%	3	2,8%
	Sí, en más ocasiones	6	10,9%	20	16,7%
	No	41	80,2%	97	80,6%
Tristeza	Sí, con mucha frecuencia	23	44,6%	42	34,7%
	Sí, en más ocasiones	22	42,6%	65	54,2%
	No	7	12,9%	13	11,1%
Incertidumbre	Sí, con mucha frecuencia	26	51,5%	57	47,2%
	Sí, en más ocasiones	22	43,6%	62	51,4%
	No	3	5,0%	2	1,4%
Sentimiento de vulnerabilidad	Sí, con mucha frecuencia	20	38,6%	42	34,7%
	Sí, en más ocasiones	26	51,5%	57	47,2%
	No	5	9,9%	22	18,1%
Irascibilidad, frustración o enfado	Sí, con mucha frecuencia	15	29,0%	47	38,9%
	Sí, en más ocasiones	25	49,0%	53	44,4%
	No	11	22,0%	20	16,7%

¿Te han diagnosticado depresión en alguna ocasión?				
		Mujer	Hombre	Total
Sí, antes del diagnóstico del cáncer de pulmón	Recuento	22	5	27
	% dentro de Género	21,8%	6,9%	15,6%
	Residuos corregidos	2,7	-2,7	
Sí, tras el diagnóstico del cáncer de pulmón	Recuento	14	4	18
	% dentro de Género	13,9%	5,6%	10,4%
	Residuos corregidos	1,8	-1,8	
No	Recuento	52	55	107
	% dentro de Género	51,5%	76,4%	61,8%
	Residuos corregidos	-3,3	3,3	
No, pero creo que tengo depresión	Recuento	11	8	19
	% dentro de Género	10,9%	11,1%	11,0%
	Residuos corregidos	,0	,0	
No sé	Recuento	2	0	2
	% dentro de Género	2,0%	0,0%	1,2%
	Residuos corregidos	1,2	-1,2	
Total	Recuento	101	72	173
	% dentro de Género	100,0%	100,0%	100,0%

## Acceso a ONG / Asociación de pacientes

		Género		Total	
		Mujer	Hombre		
¿Has acudido, en alguna ocasión, a una asociación de pacientes o a una ONG para informarte o solicitar apoyo?	Sí	Recuento	28	15	43
		% dentro de Género	34,6%	25,4%	30,7%
		Residuos corregidos	1,2	-1,2	
	No	Recuento	53	44	97
		% dentro de Género	65,4%	74,6%	69,3%
		Residuos corregidos	-1,2	1,2	
Total	Recuento	81	59	140	
	% dentro de Género	100,0%	100,0%	100,0%	

## Áreas afectadas por la enfermedad

	Género	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Familia (relaciones, roles, dinámicas, etc.)	Mujer	51	2,1683	1,86969	,26195
	Hombre	119	2,0282	1,95088	,17915
Estado de ánimo / emocional / psicológico	Mujer	51	3,2574	1,52841	,21414
	Hombre	120	2,9861	1,51085	,13777
Planes de futuro	Mujer	50	3,5960	1,51215	,21399
	Hombre	119	3,0563	1,83003	,16805
Vida cotidiana (aficiones, amistades, responsabilidades, etc.)	Mujer	51	2,8812	1,59079	,22288
	Hombre	120	2,6528	1,83460	,16730

## Siento que la enfermedad me ha hecho ser una persona más fuerte

		Género		Total
		Mujer	Hombre	
Siempre o la mayoría de veces	Recuento	44	18	62
	% dentro de Género	47,3%	29,0%	40,0%
	Residuos corregidos	2,3	-2,3	
Algunas veces	Recuento	20	16	36
	% dentro de Género	21,5%	25,8%	23,2%
	Residuos corregidos	-,6	,6	
Pocas veces o nunca	Recuento	29	28	57
	% dentro de Género	31,2%	45,2%	36,8%
	Residuos corregidos	-1,8	1,8	
Total	Recuento	93	62	155
	% dentro de Género	100,0%	100,0%	100,0%

## Cambios en la unidad familiar

		Ninguno, nada ha cambiado	Reorganización de tareas y responsabilidades	Cambios en las rutinas de la familia	Cambio de planes a nivel familiar	Un miembro de la familia ha abandonado sus estudios o trabajo	Un familiar ha tenido que venir a vivir al domicilio	Mayor unión familiar	Distanciamiento familiar	He tenido que mudarme al domicilio de otra persona	Alto impacto emocional de uno o más miembros de la familia	
Mujer	Recuento	14	35	44	29	5	7	44	4	1	38	221
	% dentro de \$CambiosFamilia	48,3%	67,3%	65,7%	58,0%	41,7%	100,0%	62,9%	40,0%	33,3%	59,4%	
Hombre	Recuento	15	17	23	21	7	0	26	6	2	26	143
	% dentro de \$CambiosFamilia	51,7%	32,7%	34,3%	42,0%	58,3%	0,0%	37,1%	60,0%	66,7%	40,6%	
Total	Recuento	29	52	67	50	12	7	70	10	3	64	364

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

## Reforzamiento de la relación de pareja

¿Crees que la relación de pareja se ha visto (o se vio) reforzada a raíz del diagnóstico?

		Género		Total
		Mujer	Hombre	
		Recuento	30	35
Sí	% dentro de Género	44,1%	61,4%	52,0%
	Residuos corregidos	-1,9	1,9	
	Recuento	16	8	24
Tal vez	% dentro de Género	23,5%	14,0%	19,2%
	Residuos corregidos	1,3	-1,3	
	Recuento	22	14	36
No	% dentro de Género	32,4%	24,6%	28,8%
	Residuos corregidos	1,0	-1,0	
	Recuento	68	57	125
Total	% dentro de Género	100,0%	100,0%	100,0%

## Primera opción al buscar apoyo

¿A quién o a qué acudes como primera opción al buscar apoyo?

		Género		Total
		Mujer	Hombre	
Otro (especificar)	Recuento	4	1	5
	% dentro de Género	4,9%	1,7%	3,6%
	Residuos corregidos	1,0	-1,0	
Amigo/a	Recuento	11	1	12
	% dentro de Género	13,6%	1,7%	8,6%
	Residuos corregidos	2,5	-2,5	
Pareja	Recuento	31	39	70
	% dentro de Género	38,3%	66,1%	50,0%
	Residuos corregidos	-3,3	3,3	
Familia	Recuento	27	12	39
	% dentro de Género	33,3%	20,3%	27,9%
	Residuos corregidos	1,7	-1,7	
Espiritualidad	Recuento	3	1	4
	% dentro de Género	3,7%	1,7%	2,9%
	Residuos corregidos	,7	-,7	
Religión	Recuento	3	3	6
	% dentro de Género	3,7%	5,1%	4,3%
	Residuos corregidos	-,4	,4	
Profesional sanitario (médico/a, psicólogo/a, enfermero/a, etc.)	Recuento	2	2	4
	% dentro de Género	2,5%	3,4%	2,9%
	Residuos corregidos	-,3	,3	
Total	Recuento	81	59	140
	% dentro de Género	100,0%	100,0%	100,0%

## Utilidad ONG

		Género		Total
		Mujer	Hombre	
	Recuento	20	9	29
Sí	% dentro de Género	37,7%	20,5%	29,9%
¿Crees que estar en	Residuos corregidos	1,9	-1,9	
contacto con una asociación	Recuento	5	6	11
de pacientes u ONG puede	% dentro de Género	9,4%	13,6%	11,3%
ayudarte o podría haberte	Residuos corregidos	-,6	,6	
sido útil en algún momento?	Recuento	28	29	57
No sé	% dentro de Género	52,8%	65,9%	58,8%
	Residuos corregidos	-1,3	1,3	
	Recuento	53	44	97
Total	% dentro de Género	100,0%	100,0%	100,0%

## 5. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Edad"

### Áreas afectadas por el cáncer de pulmón

Edad	Familia (relaciones, roles, dinámicas, etc.)	Estado de ánimo / emocional / psicológico	Planes de futuro	Vida cotidiana (aficiones, amistades, responsabilidades, etc.)
Correlación de Pearson	-,111	-,166*	-,215**	-,158*
Sig. (bilateral)	,150	,029	,005	,039

### Repercusiones emocionales

Preocupación por mi familia	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	57,5532	93	10,50906
Sí, en más ocasiones	60,8760	66	10,25801
No	62,6266	13	12,58227
Total	59,2159	172	10,67639

Tristeza	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	57,8923	64	10,09509
Sí, en más ocasiones	58,2834	88	10,21096
No	67,6108	20	11,26698
Total	59,2159	172	10,67639

Miedo	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	57,9465	83	10,75695
Sí, en más ocasiones	58,5437	63	10,58084
No	64,7194	27	9,19023
Total	59,2159	172	10,67639

Sentimiento de soledad	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	58,3194	29	11,63321
Sí, en más ocasiones	57,5937	56	9,24870
No	60,5494	87	11,14180
Total	59,2159	172	10,67639

Sensación de que me juzgan	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	56,2428	12	10,59164
Sí, en más ocasiones	55,1076	25	11,71552
No	60,2387	135	10,34618
Total	59,2107	172	10,69172

Ansiedad y estrés	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	57,5962	59	9,50978
Sí, en más ocasiones	59,0638	69	11,46415
No	61,6258	44	10,66539
Total	59,2159	172	10,67639

Preocupación por mi imagen física	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	52,5257	20	10,73141
Sí, en más ocasiones	59,7713	57	11,62925
No	60,1972	92	9,64937
Total	59,1584	168	10,69805

Vergüenza por tener la enfermedad	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	53,0072	8	13,85977
Sí, en más ocasiones	57,3444	26	10,98828
No	59,9139	139	10,35304
Total	59,2159	172	10,67639

Sensación de bloqueo	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	56,7677	39	9,92302
Sí, en más ocasiones	58,9914	70	11,17498
No	61,1402	63	10,39142
Total	59,2698	171	10,68425

Sentimiento de culpabilidad	Media	N	Desv. típ.
Sí, con mucha frecuencia	56,8507	28	7,53939
Sí, en más ocasiones	58,3493	31	9,72667
No	60,0366	113	11,51637
Total	59,2159	172	10,67639

¿Te han diagnosticado depresión en alguna ocasión?	Media	N	Desv. típ.
Sí, antes del diagnóstico del cáncer de pulmón	58,8296	20	7,62326
Sí, tras el diagnóstico del cáncer de pulmón	53,4723	14	10,88949
No	60,1655	118	11,31669
No, pero creo que tengo depresión	58,7695	19	7,46667
No sé	42,5000	1	58,90088
Total	59,2159	172	10,67639

## Acceso a ONG / Asociaciones de pacientes

¿Has acudido, en alguna ocasión, a una asociación de pacientes o a una ONG para informarte o solicitar apoyo?	Media	N	Desv. típ.
Sí	56,1669	39	10,95564
No	60,0932	101	10,65243
Total	58,9976	140	10,84334

## 6. Datos destacados del análisis bivariado: variable “Residir en capital o no capital de provincia”

### Vómitos

		Capital de provincia		Total
		No capital	Capital	
		Recuento	67	
No lo he sufrido	%	54,9%	70,6%	60,5%
	Residuos	-2,1	2,1	
	Recuento	24	9	33
Me ha afectado poco	%	19,7%	13,2%	17,4%
	Residuos	1,1	-1,1	
	Recuento	20	7	27
Me ha afectado moderadamente	%	16,4%	10,3%	14,2%
	Residuos	1,2	-1,2	
	Recuento	11	4	15
Me ha afectado mucho	%	9,0%	5,9%	7,9%
	Residuos	,8	-,8	
	Recuento	122	68	190
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%

### Dolor

		Capital de provincia		Total
		No capital	Capital	
		Recuento	20	
No lo he sufrido	%	16,8%	35,2%	23,7%
	Residuos	-2,9	2,9	
	Recuento	17	7	24
Me ha afectado poco	%	14,3%	9,9%	12,6%
	Residuos	,9	-,9	
	Recuento	42	20	62
Me ha afectado moderadamente	%	35,3%	28,2%	32,6%
	Residuos	1,0	-1,0	
	Recuento	40	19	59
Me ha afectado mucho	%	33,6%	26,8%	31,1%
	Residuos	1,0	-1,0	
	Recuento	119	71	190
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%

### Pérdida de apetito

		Capital de provincia		Total
		No capital	Capital	
		Recuento	31	
No lo he sufrido	%	25,4%	51,5%	34,7%
	Residuos	-3,6	3,6	
	Recuento	44	14	58
Me ha afectado poco	%	36,1%	20,6%	30,5%
	Residuos	2,2	-2,2	
	Recuento	23	12	35
Me ha afectado moderadamente	%	18,9%	17,6%	18,4%
	Residuos	,2	-,2	
	Recuento	24	7	31
Me ha afectado mucho	%	19,7%	10,3%	16,3%
	Residuos	1,7	-1,7	
	Recuento	122	68	190
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%

### Dificultad al respirar

		Capital de provincia		Total
		No capital	Capital	
		Recuento	29	
No lo he sufrido	%	23,0%	37,7%	28,2%
	Residuos	-2,2	2,2	
	Recuento	35	14	49
Me ha afectado poco	%	27,8%	20,3%	25,1%
	Residuos	1,2	-1,2	
	Recuento	39	17	56
Me ha afectado moderadamente	%	31,0%	24,6%	28,7%
	Residuos	,9	-,9	
	Recuento	23	12	35
Me ha afectado mucho	%	18,3%	17,4%	17,9%
	Residuos	,2	-,2	
	Recuento	126	69	195
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%

**Problemas en la piel**

		Capital de provincia		Total
		No capital	Capital	
		Recuento	36	23
No lo he sufrido	% dentro de Capital de provincia	29,3%	34,3%	31,1%
	Residuos corregidos	-,7	,7	
Me ha afectado poco	Recuento	36	27	63
	% dentro de Capital de provincia	29,3%	40,3%	33,2%
	Residuos corregidos	-1,5	1,5	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	37	11	48
	% dentro de Capital de provincia	30,1%	16,4%	25,3%
	Residuos corregidos	2,1	-2,1	
Me ha afectado mucho	Recuento	14	6	20
	% dentro de Capital de provincia	11,4%	9,0%	10,5%
	Residuos corregidos	,5	-,5	
Total	Recuento	123	67	190
	% dentro de Capital de provincia	100,0%	100,0%	100,0%

**Rotura de uñas**

		Capital de provincia		Total
		No capital	Capital	
		Recuento	65	48
No lo he sufrido	% dentro de Capital de provincia	55,1%	70,6%	60,8%
	Residuos corregidos	-2,1	2,1	
Me ha afectado poco	Recuento	30	8	38
	% dentro de Capital de provincia	25,4%	11,8%	20,4%
	Residuos corregidos	2,2	-2,2	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	17	8	25
	% dentro de Capital de provincia	14,4%	11,8%	13,4%
	Residuos corregidos	,5	-,5	
Me ha afectado mucho	Recuento	6	4	10
	% dentro de Capital de provincia	5,1%	5,9%	5,4%
	Residuos corregidos	-,2	,2	
Total	Recuento	118	68	186
	% dentro de Capital de provincia	100,0%	100,0%	100,0%

## Valoración en planes de futuro

	Capital de provincia	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
¿De qué forma dirías que el cáncer de pulmón ha cambiado tus planes de futuro? (1 es "nada" y 10 "todo")	No capital de provincia	84	8,64	1,87645	,20494
	Capital de Provincia	54	7,6	2,56410	,34981

## 7. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Tamaño de municipio de residencia"

### Síntomas y efectos secundarios

#### Dolor

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	3	6	13	22
	%	9,7%	14,6%	23,6%	17,3%
	Residuos	-1,3	-,6	1,6	
Me ha afectado poco	Recuento	1	8	11	20
	%	3,2%	19,5%	20,0%	15,7%
	Residuos	-2,2	,8	1,1	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	19	11	15	45
	%	61,3%	26,8%	27,3%	35,4%
	Residuos	3,5	-1,4	-1,7	
Me ha afectado mucho	Recuento	8	16	16	40
	%	25,8%	39,0%	29,1%	31,5%
	Residuos	-,8	1,3	-,5	
Total	Recuento	31	41	55	127
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

#### Cansancio / fatiga

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	2	1	3	6
	%	6,1%	2,4%	5,1%	4,5%
	Residuos corregidos	,5	-,8	,3	
Me ha afectado poco	Recuento	2	4	9	15
	%	6,1%	9,5%	15,3%	11,2%
	Residuos corregidos	-1,1	-,4	1,3	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	10	18	25	53
	%	30,3%	42,9%	42,4%	39,6%
	Residuos corregidos	-1,3	,5	,6	
Me ha afectado mucho	Recuento	19	19	22	60
	%	57,6%	45,2%	37,3%	44,8%
	Residuos corregidos	1,7	,1	-1,5	
Total	Recuento	33	42	59	134
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Tos

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
e					
No lo he sufrido	Recuento	5	10	24	39
	%	15,6%	23,3%	42,1%	29,5%
	Residuos corregidos	-2,0	-1,1	2,8	
Me ha afectado poco	Recuento	13	14	12	39
	%	40,6%	32,6%	21,1%	29,5%
	Residuos corregidos	1,6	,5	-1,9	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	7	16	13	36
	%	21,9%	37,2%	22,8%	27,3%
	Residuos corregidos	-,8	1,8	-1,0	
Me ha afectado mucho	Recuento	7	3	8	18
	%	21,9%	7,0%	14,0%	13,6%
	Residuos corregidos	1,6	-1,5	,1	
Total	Recuento	32	43	57	132
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Dificultad al respirar

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	6	8	20	34
	%	19,4%	19,0%	33,9%	25,8%
	Residuos corregidos	-,9	-1,2	1,9	
Me ha afectado poco	Recuento	6	15	16	37
	%	19,4%	35,7%	27,1%	28,0%
	Residuos corregidos	-1,2	1,3	-,2	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	9	14	16	39
	%	29,0%	33,3%	27,1%	29,5%
	Residuos corregidos	-,1	,7	-,5	
Me ha afectado mucho	Recuento	10	5	7	22
	%	32,3%	11,9%	11,9%	16,7%
	Residuos corregidos	2,7	-1,0	-1,3	
Total	Recuento	31	42	59	132
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Dificultad al tragar

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	12	25	32	69
	%	37,5%	58,1%	58,2%	53,1%
	Residuos	-2,0	,8	1,0	
Me ha afectado poco	Recuento	6	9	15	30
	%	18,8%	20,9%	27,3%	23,1%
	Residuos	-,7	-,4	1,0	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	11	7	6	24
	%	34,4%	16,3%	10,9%	18,5%
	Residuos	2,7	-,5	-1,9	
Me ha afectado mucho	Recuento	3	2	2	7
	%	9,4%	4,7%	3,6%	5,4%
	Residuos	1,2	-,3	-,8	
Total	Recuento	32	43	55	130
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Pérdida del cabello

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	11	15	30	56
	%	33,3%	37,5%	54,5%	43,8%
	Residuos corregidos	-1,4	-1,0	2,1	
Me ha afectado poco	Recuento	6	11	6	23
	%	18,2%	27,5%	10,9%	18,0%
	Residuos corregidos	,0	1,9	-1,8	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	7	5	11	23
	%	21,2%	12,5%	20,0%	18,0%
	Residuos corregidos	,6	-1,1	,5	
Me ha afectado mucho	Recuento	9	9	8	26
	%	27,3%	22,5%	14,5%	20,3%
	Residuos corregidos	1,2	,4	-1,4	
Total	Recuento	33	40	55	128
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Pérdida de apetito

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	N	4	14	19	37
	%	12,1%	32,6%	34,5%	28,2%
	Residuos	-2,4	,8	1,4	
Me ha afectado poco	N	12	14	19	45
	%	36,4%	32,6%	34,5%	34,4%
	Residuos	,3	-,3	,0	
Me ha afectado moderadamente	N	10	8	6	24
	%	30,3%	18,6%	10,9%	18,3%
	Residuos	2,1	,1	-1,9	
Me ha afectado mucho	N	7	7	11	25
	%	21,2%	16,3%	20,0%	19,1%
	Residuos	,4	-,6	,2	
Total	N	33	43	55	131
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Pérdida / aumento de peso

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	3	4	15	22
	%	9,4%	9,5%	26,8%	16,9%
	Residuos corregidos	-1,3	-1,6	2,6	
Me ha afectado poco	Recuento	8	14	15	37
	%	25,0%	33,3%	26,8%	28,5%
	Residuos corregidos	-,5	,9	-,4	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	13	18	14	45
	%	40,6%	42,9%	25,0%	34,6%
	Residuos corregidos	,8	1,4	-2,0	
Me ha afectado mucho	Recuento	8	6	12	26
	%	25,0%	14,3%	21,4%	20,0%
	Residuos corregidos	,8	-1,1	,4	
Total	Recuento	32	42	56	130
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Hormigueo de manos y/o pies

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	9	8	22	39
	%	27,3%	19,0%	39,3%	29,8%
	Residuos corregidos	-,4	-1,8	2,1	
Me ha afectado poco	Recuento	8	13	12	33
	%	24,2%	31,0%	21,4%	25,2%
	Residuos corregidos	-,1	1,0	-,9	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	8	13	17	38
	%	24,2%	31,0%	30,4%	29,0%
	Residuos corregidos	-,7	,3	,3	
Me ha afectado mucho	Recuento	8	8	5	21
	% dentro de Tamaño del municipio	24,2%	19,0%	8,9%	16,0%
	Residuos corregidos	1,5	,6	-1,9	
	Total	33	42	56	131
	% dentro de Tamaño del municipio	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Calambres

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	18	11	24	53
	%	56,2%	26,2%	44,4%	41,4%
	Residuos corregidos	2,0	-2,4	,6	
Me ha afectado poco	Recuento	7	16	16	39
	%	21,9%	38,1%	29,6%	30,5%
	Residuos corregidos	-1,2	1,3	-,2	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	3	15	12	30
	%	9,4%	35,7%	22,2%	23,4%
	Residuos corregidos	-2,2	2,3	-,3	
Me ha afectado mucho	Recuento	4	0	2	6
	%	12,5%	0,0%	3,7%	4,7%
	Residuos corregidos	2,4	-1,8	-,4	
Total	Recuento	32	42	54	128
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Problemas en la piel

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	Recuento	9	16	14	39
	%	27,3%	38,1%	25,0%	29,8%
	Residuos corregidos	-,4	1,4	-1,0	
Me ha afectado poco	Recuento	12	14	15	41
	%	36,4%	33,3%	26,8%	31,3%
	Residuos corregidos	,7	,3	-1,0	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	4	9	23	36
	%	12,1%	21,4%	41,1%	27,5%
	Residuos corregidos	-2,3	-1,1	3,0	
Me ha afectado mucho	Recuento	8	3	4	15
	%	24,2%	7,1%	7,1%	11,5%
	Residuos corregidos	2,7	-1,1	-1,3	
Total	Recuento	33	42	56	131
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Ronquera u otras alteraciones de la voz

		Tamaño del municipio			Total
		Pequeño	Medio	Grande	
No lo he sufrido	N	11	16	30	57
	%	35,5%	38,1%	52,6%	43,8%
	Residuos	-1,1	-,9	1,8	
Me ha afectado poco	N	6	14	15	35
	%	19,4%	33,3%	26,3%	26,9%
	Residuos	-1,1	1,1	-,1	
Me ha afectado moderadamente	N	7	9	7	23
	%	22,6%	21,4%	12,3%	17,7%
	Residuos	,8	,8	-1,4	
Me ha afectado mucho	N	7	3	5	15
	%	22,6%	7,1%	8,8%	11,5%
	Residuos	2,2	-1,1	-,9	
Total	N	31	42	57	130
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Impacto en vida sexual

		Tamaño del municipio			Total	
		Pequeño	Medio	Grande		
En caso de que tu vida sexual se haya visto afectada a raíz del diagnóstico del cáncer de pulmón, ¿has acudido a profesionales sanitarios para buscar ayuda?	Mi vida sexual no se ha visto afectada	N	8	7	24	39
		%	40,0%	21,9%	53,3%	40,2%
		Residuos	,0	-2,6	2,5	
	Sí he tenido dificultades de índole sexual, pero no he acudido a profesionales sanitarios	N	11	21	20	52
		%	55,0%	65,6%	44,4%	53,6%
		Residuos	,1	1,7	-1,7	
	Sí he tenido dificultades de índole sexual y he acudido a profesionales sanitarios	N	1	4	1	6
		%	5,0%	12,5%	2,2%	6,2%
		Residuos	-,2	1,8	-1,5	
Total	N	20	32	45	97	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

## Impacto económico

		Tamaño del municipio			Total	
		Pequeño	Medio	Grande		
Impacto del cáncer de pulmón a nivel económico	Impacto negativo o muy negativo	N	12	21	16	49
		%	60,0%	70,0%	35,6%	51,6%
		N	,8	2,4	-3,0	
	No ha tenido impacto	%	8	8	29	45
		N	40,0%	26,7%	64,4%	47,4%
		%	-,7	-2,7	3,2	
	Impacto positivo o muy positivo	N	0	1	0	1
		%	0,0%	3,3%	0,0%	1,1%
		N	-,5	1,5	-1,0	
Total		N	20	30	45	95
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Acompañamiento al médico u otras actividades cotidianas

¿Tienes personas a tu alrededor que puedan acompañarte al médico si lo necesitas o que puedan ayudarte en actividades cotidianas (recados, compras, tareas del hogar, etc.)?

		Tamaño del municipio			Total	
		Pequeño	Medio	Grande		
Sí, siempre	Recuento	12	25	42	79	
	%	63,2%	80,6%	95,5%	84,0%	
	Residuos corregidos	-2,8	-,6	2,8		
La mayoría de veces	Recuento	4	5	1	10	
	%	21,1%	16,1%	2,3%	10,6%	
	Residuos corregidos	1,6	1,2	-2,5		
Algunas veces	Recuento	0	1	1	2	
	%	0,0%	3,2%	2,3%	2,1%	
	Residuos corregidos	-,7	,5	,1		
Pocas veces	Recuento	2	0	0	2	
	%	10,5%	0,0%	0,0%	2,1%	
	Residuos	2,8	-1,0	-1,3		
Nunca o casi nunca	Recuento	1	0	0	1	
	%	5,3%	0,0%	0,0%	1,1%	
	Residuos corregidos	2,0	-,7	-,9		
Total		Recuento	19	31	44	94
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Ocultar la enfermedad

		Tamaño del municipio			Total	
		Pequeño	Medio	Grande		
Trato de mantener la enfermedad en secreto	Siempre o la mayoría de veces	Recuento	0	5	7	12
		% dentro de Tamaño del municipio	0,0%	13,9%	15,2%	11,8%
		Residuos corregidos	-1,8	,5	1,0	
	Algunas veces	Recuento	0	3	7	10
		% dentro de Tamaño del municipio	0,0%	8,3%	15,2%	9,8%
		Residuos corregidos	-1,6	-,4	1,7	
	Pocas veces o nunca	Recuento	20	28	32	80
		% dentro de Tamaño del municipio	100,0%	77,8%	69,6%	78,4%
		Residuos corregidos	2,6	-,1	-2,0	
Total	Recuento	20	36	46	102	
	% dentro de Tamaño del municipio	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

## 8. Datos destacados del análisis bivariado: variable “Nivel educativo”

Estudios primarios (EP) – Estudios secundarios (ES) – Estudios universitarios (EU)

### Repercusiones funcionales

		§ActividadesRealizarSolo*								Total	
		Aseo (lavarse, ducharse, etc.)	Hacer tareas hogar	Viajar	Dormir y descansar	Recordar o concentrarme	Realizar la alimentación habitual	Hacer ejercicio físico	Puedo hacer todas actividades sin ayuda		
Nivel de estudios	Estudios primarios (EP)	N	7	17	14	7	8	5	26	24	107
		%	6,1%	15,7%	12,7%	6,6%	7,7%	4,5%	<b>24,6%</b>	22,1%	
	Estudios secundarios (ES)	N	6	22	15	11	18	9	22	27	130
		%	4,9%	16,8%	11,5%	8,4%	<b>13,5%</b>	<b>6,9%</b>	17,2%	20,8%	
	Estudios universitarios (EU)	N	5	15	16	7	8	2	18	38	110
		%	4,9%	14,0%	14,3%	6,3%	7,6%	1,8%	16,5%	<b>34,6%</b>	
	Total	N	18	54	44	25	34	16	67	89	347

### Acceso a ONG / Asociación de pacientes

		Nivel de estudios			Total	
		EP	ES	EU		
¿Crees que estar en contacto con una asociación de pacientes u ONG puede ayudarte o podría haberte sido útil en algún momento?	Sí	Recuento	10	11	5	26
		% dentro de Nivel de estudios	41,7%	28,9%	12,8%	25,7%
		Residuos corregidos	2,0	,6	-2,4	
	No	Recuento	2	3	7	12
		% dentro de Nivel de estudios	8,3%	7,9%	17,9%	11,9%
		Residuos corregidos	-,6	-1,0	1,5	
	No sé	Recuento	12	24	27	63
		% dentro de Nivel de estudios	50,0%	63,2%	69,2%	62,4%
		Residuos corregidos	-1,4	,1	1,1	
Total		Recuento	24	38	39	101
		% dentro de Nivel de estudios	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Efectos secundarios y síntomas

### Cansancio / fatiga

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	3	1	6	10
	%	4,5%	1,7%	8,7%	5,1%
	Residuos	-,3	-1,5	1,7	
Me ha afectado poco	Recuento	4	6	13	23
	%	6,0%	10,0%	18,8%	11,7%
	Residuos	-1,8	-,5	2,3	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	21	27	30	78
	%	31,3%	45,0%	43,5%	39,8%
	Residuos	-1,7	1,0	,8	
Me ha afectado mucho	Recuento	39	26	20	85
	%	58,2%	43,3%	29,0%	43,4%
	Residuos	3,0	,0	-3,0	
Total	Recuento	67	60	69	196
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Pérdida del apetito

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	12	17	36	65
	%	18,8%	29,3%	55,4%	34,8%
	Residuos	-3,3	-1,0	4,3	
Me ha afectado poco	Recuento	20	22	15	57
	%	31,2%	37,9%	23,1%	30,5%
	Residuos	,2	1,5	-1,6	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	15	9	11	35
	%	23,4%	15,5%	16,9%	18,7%
	Residuos	1,2	-,8	-,5	
Me ha afectado mucho	Recuento	17	10	3	30
	%	26,6%	17,2%	4,6%	16,0%
	Residuos	2,8	,3	-3,1	
Total	Recuento	64	58	65	187
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Dificultad al tragar

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	29	28	46	103
	%	45,3%	47,5%	67,6%	53,9%
	Residuos	-1,7	-1,2	2,8	
Me ha afectado poco	Recuento	19	8	14	41
	%	29,7%	13,6%	20,6%	21,5%
	Residuos	2,0	-1,8	-,2	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	12	14	8	34
	%	18,8%	23,7%	11,8%	17,8%
	Residuos	,2	1,4	-1,6	
Me ha afectado mucho	Recuento	4	9	0	13
	%	6,2%	15,3%	0,0%	6,8%
	Residuos	-,2	3,1	-2,8	
Total	Recuento	64	59	68	191
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Pérdida del cabello

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	29	17	30	76
	%	46,0%	28,3%	44,1%	39,8%
	Residuos	1,2	-2,2	,9	
Me ha afectado poco	Recuento	14	10	13	37
	%	22,2%	16,7%	19,1%	19,4%
	Residuos	,7	-,6	-,1	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	11	11	16	38
	%	17,5%	18,3%	23,5%	19,9%
	Residuos	-,6	-,4	,9	
Me ha afectado mucho	Recuento	9	22	9	40
	%	14,3%	36,7%	13,2%	20,9%
	Residuos	-1,6	3,6	-1,9	
Total	Recuento	63	60	68	191
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Tos

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	15	13	30	58
	%	22,7%	21,3%	44,1%	29,7%
	Residuos	-1,5	-1,7	3,2	
Me ha afectado poco	Recuento	20	24	12	56
	%	30,3%	39,3%	17,6%	28,7%
	Residuos	,3	2,2	-2,5	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	17	18	19	54
	%	25,8%	29,5%	27,9%	27,7%
	Residuos	-,4	,4	,1	
Me ha afectado mucho	Recuento	14	6	7	27
	%	21,2%	9,8%	10,3%	13,8%
	Residuos	2,1	-1,1	-1,1	
Total	Recuento	66	61	68	195
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Hormigueo de manos y pies

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	19	13	24	56
	%	29,2%	22,0%	35,8%	29,3%
	Residuos	,0	-1,5	1,5	
Me ha afectado poco	Recuento	11	21	18	50
	%	16,9%	35,6%	26,9%	26,2%
	Residuos	-2,1	2,0	,2	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	26	15	14	55
	%	40,0%	25,4%	20,9%	28,8%
	Residuos	2,5	-,7	-1,8	
Me ha afectado mucho	Recuento	9	10	11	30
	%	13,8%	16,9%	16,4%	15,7%
	Residuos	-,5	,3	,2	
Total	Recuento	65	59	67	191
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Vómitos

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	35	31	49	115
	%	53,0%	54,4%	73,1%	60,5%
	Residuos	-1,5	-1,1	2,6	
Me ha afectado poco	Recuento	16	11	6	33
	%	24,2%	19,3%	9,0%	17,4%
	Residuos	1,8	,5	-2,3	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	11	10	6	27
	%	16,7%	17,5%	9,0%	14,2%
	Residuos	,7	,9	-1,5	
Me ha afectado mucho	Recuento	4	5	6	15
	%	6,1%	8,8%	9,0%	7,9%
	Residuos	-,7	,3	,4	
Total	Recuento	66	57	67	190
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Reacciones alérgicas

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	45	31	47	123
	%	71,4%	53,4%	73,4%	66,5%
	Residuos	1,0	-2,5	1,5	
Me ha afectado poco	Recuento	16	16	10	42
	%	25,4%	27,6%	15,6%	22,7%
	Residuos	,6	1,1	-1,7	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	0	7	6	13
	%	0,0%	12,1%	9,4%	7,0%
	Residuos	-2,7	1,8	,9	
Me ha afectado mucho	Recuento	2	4	1	7
	%	3,2%	6,9%	1,6%	3,8%
	Residuos	-,3	1,5	-1,2	
Total	Recuento	63	58	64	185
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Ronquera u otras alteraciones de la voz

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
No lo he sufrido	Recuento	20	23	38	81
	%	31,2%	39,0%	58,5%	43,1%
	Residuos	-2,4	-,8	3,1	
Me ha afectado poco	Recuento	20	17	19	56
	%	31,2%	28,8%	29,2%	29,8%
	Residuos	,3	-,2	-,1	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	13	11	6	30
	%	20,3%	18,6%	9,2%	16,0%
	Residuos	1,2	,7	-1,8	
Me ha afectado mucho	Recuento	11	8	2	21
	%	17,2%	13,6%	3,1%	11,2%
	Residuos	1,9	,7	-2,6	
Total	Recuento	64	59	65	188
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Reacciones emocionales

### Preocupación por mi familia

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	35	27	31	93
	%	66,0%	47,4%	48,4%	53,4%
	Residuos	2,2	-1,1	-1,0	
Sí, en más ocasiones	Recuento	17	23	27	67
	%	32,1%	40,4%	42,2%	38,5%
	Residuos	-1,2	,3	,8	
No	Recuento	1	7	6	14
	%	1,9%	12,3%	9,4%	8,0%
	Residuos	-2,0	1,4	,5	
Total	Recuento	53	57	64	174
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Miedo

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	34	23	26	83
	%	64,2%	41,1%	40,6%	48,0%
	Residuos	2,8	-1,3	-1,5	
Sí, en más ocasiones	Recuento	13	29	21	63
	%	24,5%	51,8%	32,8%	36,4%
	Residuos	-2,2	2,9	-,8	
No	Recuento	6	4	17	27
	%	11,3%	7,1%	26,6%	15,6%
	Residuos	-1,0	-2,1	3,0	
Total	Recuento	53	56	64	173
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Sensación de bloqueo

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	15	14	10	39
	%	28,3%	25,9%	15,6%	22,8%
	Residuos	1,1	,7	-1,7	
Sí, en más ocasiones	Recuento	23	22	24	69
	%	43,4%	40,7%	37,5%	40,4%
	Residuos	,5	,1	-,6	
No	Recuento	15	18	30	63
	%	28,3%	33,3%	46,9%	36,8%
	Residuos	-1,6	-,6	2,1	
Total	Recuento	53	54	64	171
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Preocupación por mi imagen física

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	5	6	8	19
	%	9,4%	11,1%	12,9%	11,2%
	Residuos	-,5	,0	,5	
Sí, en más ocasiones	Recuento	13	21	24	58
	%	24,5%	38,9%	38,7%	34,3%
	Residuos	-1,8	,9	,9	
No	Recuento	35	27	30	92
	%	66,0%	50,0%	48,4%	54,4%
	Residuos	2,0	-,8	-1,2	
Total	Recuento	53	54	62	169
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Sensación de que me juzgan

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	2	9	2	13
	%	3,8%	16,1%	3,1%	7,5%
	Residuos	-1,2	3,0	-1,7	
Sí, en más ocasiones	Recuento	7	7	12	26
	%	13,2%	12,5%	18,5%	14,9%
	Residuos	-,4	-,6	1,0	
No	Recuento	44	40	51	135
	%	83,0%	71,4%	78,5%	77,6%
	Residuos	1,1	-1,3	,2	
Total	Recuento	53	56	65	174
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Vergüenza por tener la enfermedad

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	2	5	1	8
	%	3,8%	9,1%	1,5%	4,7%
	Residuos	-,3	1,9	-1,5	
Sí, en más ocasiones	Recuento	4	5	16	25
	%	7,7%	9,1%	24,6%	14,5%
	Residuos	-1,7	-1,4	2,9	
No	Recuento	46	45	48	139
	%	88,5%	81,8%	73,8%	80,8%
	Residuos	1,7	,2	-1,8	
Total	Recuento	52	55	65	172
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Incertidumbre

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	31	28	25	84
	%	58,5%	50,0%	39,1%	48,6%
	Residuos	1,7	,3	-1,9	
	Recuento	21	26	37	84

Sí, en más ocasiones	%	39,6%	46,4%	57,8%	48,6%
	Residuos	-1,6	-,4	1,9	
No	Recuento	1	2	2	5
	%	1,9%	3,6%	3,1%	2,9%
	Residuos	-,5	,4	,1	
Total	Recuento	53	56	64	173
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Impacto económico

		Nivel de estudios			Total	
		EP	ES	EU		
Impacto del cáncer de pulmón a nivel económico	Impacto negativo o muy negativo	Recuento	16	32	17	65
		%	44,4%	64,0%	30,4%	45,8%
		Residuos	-,2	3,2	-3,0	
	No ha tenido impacto	Recuento	20	17	36	73
		%	55,6%	34,0%	64,3%	51,4%
		Residuos	,6	-3,1	2,5	
	Impacto positivo o muy positivo	Recuento	0	1	3	4
		%	0,0%	2,0%	5,4%	2,8%
		Residuos	-1,2	-,4	1,5	
Total	Recuento	36	50	56	142	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

**Motivos de tener menos recursos económicos**

		Reducción de ingresos por motivos laborales	Reducción de por tener pensión más reducida que salario que percibía	Reducción de ingresos a nivel familiar como consecuencia de la enfermedad	Mayores gastos por traslado al hospital	Mayores gastos por compra de medicamentos y otros productos sanitarios	Mayores gastos por acudir a servicios sanitarios privados	Mayores gastos asociados a nuevos hábitos (cambios en la dieta, rehabilitación, compra dispositivos/utensilios ..)	Mayores gastos por contratación de personas cuidadoras	Otros motivos	
Estudios primarios	N	3	4	2	9	4	1	7	3	1	32
	%	10,4%	13,5%	5,2%	27,4%	11,9%	1,6%	20,2%	8,3%	1,6%	
Estudios secundarios	N	10	12	9	8	4	7	6	1	2	59
	%	17,7%	20,5%	15,9%	13,1%	7,1%	11,1%	10,0%	1,7%	2,8%	
Estudios universitarios	N	10	6	2	1	2	2	4	2	1	28
	%	34,9%	21,6%	7,2%	1,8%	7,2%	5,4%	12,7%	7,2%	1,8%	
Total	Recuento	23	22	13	17	10	9	16	6	3	119

**Valorar más las cosas importantes de la vida**

		Nivel de estudios			Total
		EP	ES	EU	
Sí, siempre	Recuento	22	17	13	52
	%	51,2%	34,0%	21,7%	34,0%
	Residuos	2,8	,0	-2,6	
La mayoría de veces	Recuento	14	21	32	67
	%	32,6%	42,0%	53,3%	43,8%
	Residuos	-1,8	-,3	1,9	
Algunas veces	Recuento	4	8	4	16
	%	9,3%	16,0%	6,7%	10,5%
	Residuos	-,3	1,6	-1,2	
Pocas veces	Recuento	1	2	6	9
	%	2,3%	4,0%	10,0%	5,9%
	Residuos	-1,2	-,7	1,7	
Nunca o casi nunca	Recuento	2	2	5	9
	%	4,7%	4,0%	8,3%	5,9%
	Residuos	-,4	-,7	1,0	
Total	Recuento	43	50	60	153

## 9. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Fase de la enfermedad"

- Local - Cáncer de pulmón localizado (tórax)
- CPLM . Cáncer de pulmón localizado (tórax) y posteriormente con metástasis (diseminado)
- Diseminado - Cáncer de pulmón con metástasis (diseminado)

### Síntomas y efectos secundarios

#### Dolor

		Diagnóstico			Total
		(localizado/metástasis)			
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	N	16	9	17	42
	%	21,1%	23,7%	25,0%	23,1%
	Residuo	-,5	,1	,5	
Me ha afectado poco	N	13	3	8	24
	%	17,1%	7,9%	11,8%	13,2%
	Residuo	1,3	-1,1	-,4	
Me ha afectado moderadamente	N	26	17	16	59
	%	34,2%	44,7%	23,5%	32,4%
	Residuo	,4	1,8	-2,0	
Me ha afectado mucho	N	21	9	27	57
	%	27,6%	23,7%	39,7%	31,3%
	Residuo	-,9	-1,1	1,9	
Total	N	76	38	68	182
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

#### Cansancio / fatiga

		Diagnóstico			Total
		(localizado/metástasis)			
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	N	1	2	5	8
	%	1,3%	5,0%	7,2%	4,3%
	Residuos	-1,7	,3	1,5	
Me ha afectado poco	N	10	2	9	21
	%	12,8%	5,0%	13,0%	11,2%
	Residuos	,6	-1,4	,6	
Me ha afectado moderadamente	N	39	13	23	75
	%	50,0%	32,5%	33,3%	40,1%
	Residuos	2,3	-1,1	-1,4	
Me ha afectado mucho	N	28	23	32	83
	%	35,9%	57,5%	46,4%	44,4%
	Residuos	-2,0	1,9	,4	
Total	N	78	40	69	187
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Fiebre

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	N	51	19	41	111
	%	69,9%	47,5%	61,2%	61,7%
	Residuos	1,9	-2,1	-,1	
Me ha afectado poco	N	9	14	12	35
	%	12,3%	35,0%	17,9%	19,4%
	Residuos	-2,0	2,8	-,4	
Me ha afectado moderadamente	N	10	6	12	28
	%	13,7%	15,0%	17,9%	15,6%
	Residuos	-,6	-,1	,7	
Me ha afectado mucho	N	3	1	2	6
	%	4,1%	2,5%	3,0%	3,3%
	Residuos	,5	-,3	-,2	
Total	N	73	40	67	180
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Tos

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	N	20	11	25	56
	%	26,3%	28,2%	36,2%	30,4%
	Residuos	-1,0	-,3	1,3	
Me ha afectado poco	N	26	12	14	52
	%	34,2%	30,8%	20,3%	28,3%
	Residuos	1,5	,4	-1,9	
Me ha afectado moderadamente	N	16	13	23	52
	%	21,1%	33,3%	33,3%	28,3%
	Residuos	-1,8	,8	1,2	
Me ha afectado mucho	N	14	3	7	24
	%	18,4%	7,7%	10,1%	13,0%
	Residuos	1,8	-1,1	-,9	
Total	N	76	39	69	184
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Dificultad al respirar

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	N	14	13	24	51
	%	18,4%	32,5%	34,8%	27,6%
	Residuos	-2,3	,8	1,7	
Me ha afectado poco	N	22	10	16	48
	%	28,9%	25,0%	23,2%	25,9%
	Residuos	,8	-,2	-,7	
Me ha afectado moderadamente	N	27	9	18	54
	%	35,5%	22,5%	26,1%	29,2%
	Residuos	1,6	-1,1	-,7	
Me ha afectado mucho	N	13	8	11	32
	%	17,1%	20,0%	15,9%	17,3%
	Residuos	-,1	,5	-,4	
Total	Recuento	76	40	69	185
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Dificultad al tragar

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	N	43	20	36	99
	%	55,1%	52,6%	53,7%	54,1%
	Residuos	,2	-,2	-,1	
Me ha afectado poco	N	17	7	17	41
	%	21,8%	18,4%	25,4%	22,4%
	Residuos	-,2	-,7	,7	
Me ha afectado moderadamente	N	12	10	8	30
	%	15,4%	26,3%	11,9%	16,4%
	Residuos	-,3	1,9	-1,2	
Me ha afectado mucho	N	6	1	6	13
	%	7,7%	2,6%	9,0%	7,1%
	Residuos	,3	-1,2	,7	
Total	N	78	38	67	183
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Pérdida del cabello

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	N	35	9	28	72
	%	47,3%	23,7%	41,2%	40,0%
	Residuos	1,7	-2,3	,3	
Me ha afectado poco	N	15	8	11	34
	%	20,3%	21,1%	16,2%	18,9%
	Residuos	,4	,4	-,7	
Me ha afectado moderadamente	N	16	10	11	37
	%	21,6%	26,3%	16,2%	20,6%
	Residuos	,3	1,0	-1,1	
Me ha afectado mucho	N	8	11	18	37
	%	10,8%	28,9%	26,5%	20,6%
	Residuos	-2,7	1,4	1,5	
Total	Recuento	74	38	68	180
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Problemas en la piel

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	Recuento	31	10	12	53
	%	40,8%	27,8%	17,6%	29,4%
	Residuos	2,9	-,2	-2,7	
Me ha afectado poco	Recuento	25	14	21	60
	%	32,9%	38,9%	30,9%	33,3%
	Residuos	-,1	,8	-,5	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	15	9	23	47
	%	19,7%	25,0%	33,8%	26,1%
	Residuos	-1,7	-,2	1,8	
Me ha afectado mucho	Recuento	5	3	12	20
	%	6,6%	8,3%	17,6%	11,1%
	Residuos	-1,7	-,6	2,2	
Total	Recuento	76	36	68	180
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### Pérdida de apetito

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminado	
No lo he sufrido	Recuento	26	12	23	61
	% dentro de CPLM	35,1%	32,4%	33,8%	34,1%
	Residuos corregidos	,3	-,2	-,1	
Me ha afectado poco	Recuento	24	14	17	55
	% dentro de % CPLM	32,4%	37,8%	25,0%	30,7%
	Residuos corregidos	,4	1,1	-1,3	
Me ha afectado moderadamente	Recuento	10	9	14	33
	% dentro de CPLM)	13,5%	24,3%	20,6%	18,4%
	Residuos corregidos	-1,4	1,0	,6	
Me ha afectado mucho	Recuento	14	2	14	30
	% dentro de CPLM)	18,9%	5,4%	20,6%	16,8%
	Residuos corregidos	,6	-2,1	1,1	
Total	Recuento	74	37	68	179
	% dentro de CPLM)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Reacciones alérgicas

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminad	
No lo he sufrido	N	55	23	42	120
	%	75,3%	60,5%	62,7%	67,4%
	Residuos	1,9	-1,0	-1,0	
Me ha afectado poco	N	12	10	17	39
	%	16,4%	26,3%	25,4%	21,9%
	Residuos	-1,5	,7	,9	
Me ha afectado moderadamente	N	3	4	6	13
	%	4,1%	10,5%	9,0%	7,3%
	Residuos	-1,4	,9	,7	
Me ha afectado mucho	N	3	1	2	6
	%	4,1%	2,6%	3,0%	3,4%
	Residuos	,5	-,3	-,2	
Total	N	73	38	67	178
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Rotura de uñas

		Diagnóstico (localizado/metástasis)			Total
		CPL	CPLM	Diseminad	
No lo he sufrido	N	48	24	38	110
	%	64,9%	63,2%	55,9%	61,1%
	Residuos	,9	,3	-1,1	
Me ha afectado poco	N	17	7	10	34
	%	23,0%	18,4%	14,7%	18,9%
	Residuos	1,2	-,1	-1,1	
Me ha afectado moderadamente	N	5	7	14	26
	%	6,8%	18,4%	20,6%	14,4%
	Residuos	-2,5	,8	1,8	
Me ha afectado mucho	N	4	0	6	10
	%	5,4%	0,0%	8,8%	5,6%
	Residuos	-,1	-1,7	1,5	
Total	N	74	38	68	180
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Repercusiones funcionales

		Aseo (lavarse, ducharse)	Hacer tareas hogar	Viajar	Dormir y descansar	Recordar o concentrarme	Realizar la alimentación habitual	Hacer ejercicio físico	Puedo hacer actividades sin ayuda		
Diagnóstico (localizado/ metástasis)	Localizado	N	5	14	11	11	7	4	15	48	115
		%	4,2%	12,1%	9,8%	9,5%	6,3%	3,2%	13,4%	41,6%	
	Localizado y post. Metástas.	N	3	15	9	3	9	3	15	15	70
		%	3,8%	20,7%	13,1%	4,5%	12,1%	3,8%	20,7%	21,2%	
	Metástasis	N	11	25	24	11	16	10	32	25	153
		%	7,0%	16,1%	15,6%	7,0%	10,6%	6,2%	20,9%	16,6%	
Total		N	18	53	44	25	32	16	62	88	338

## Áreas afectadas por la enfermedad

### Familia

	N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
Localizado	68	<b>1,6</b>	1,83406	,22193	1,1510	2,0369	,00	5,00
Localizado y post. Metástas.	35	<b>2,2</b>	1,73371	,29395	1,6335	2,8286	,00	5,00
Metástas.	62	<b>2,5</b>	2,05558	,26194	1,9761	3,0239	,00	5,00
Total	165	<b>2,0674</b>	1,93323	,15065	1,7699	2,3649	,00	5,00

### Planes de futuro

	N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
Localizado	70	<b>2,75</b>	1,83445	,21931	2,3198	3,1948	,00	5,00
Localizado y post. metástasis	34	<b>3,6</b>	1,56297	,26695	3,0772	4,1630	,00	5,00
Metástasis	59	<b>3,45</b>	1,70731	,22150	3,0050	3,8916	,00	5,00
Total	164	3,2	1,76559	,13801	2,9163	3,4614	,00	5,00

### Vida cotidiana

	N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
Localizado	70	<b>2,3</b>	1,71827	,20542	1,8614	2,6810	,00	5,00
Localizado y post. metástasis	35	<b>2,9</b>	1,80504	,30605	2,2918	3,5361	,00	5,00
Metástasis	62	<b>3,1</b>	1,73569	,22118	2,6447	3,5293	,00	5,00
Total	166	2,7	1,77325	,13749	2,4362	2,9791	,00	5,00

## Cambios en la familia

		Ninguno, nada ha cambiado	Reorganización de tareas y responsabilidades	Cambios en las rutinas de la familia	Cambio de planes a nivel familiar	Un miembro ha abandonado sus estudios o trabajo	Un familiar ha tenido que venir a vivir al domicilio	Mayor unión familiar	Distanciamiento familiar	Me he mudado al domicilio de otra persona	Alto impacto emocional en miembros de familia	
Localizado	N	21	15	18	20	7	1	25	3	1	26	135
	%	15,2%	11,0%	13,4%	14,7%	5,3%	0,4%	18,5%	2,0%	0,4%	19,1%	
Localizado y post. metástasis)	N	9	13	13	11	2	2	10	3	0	11	74
	%	12,0%	17,0%	17,7%	14,7%	2,9%	2,1%	13,8%	4,5%	0,0%	15,2%	
Metástasis	N	3	18	27	17	5	2	29	6	3	23	133
	%	2,0%	13,6%	20,2%	12,5%	3,7%	1,1%	22,2%	4,5%	2,5%	17,7%	
Total	N	32	46	58	47	14	4	65	12	4	60	342

## Repercusiones negativas en relación de pareja

		No se ha visto afectada forma negativa	Menos tiempo para tener espacios compartidos	Ruptura de pareja tras el diagnóstico	Dificultad para expresar emociones y sentimientos	Más discusiones y conflictos a partir del diagnóstico	La vida íntima y sexual se ha reducido	Malestar cambio de roles y dinámicas pareja	Falta de comprensión/ empatía por parte de mi pareja	No saber cómo podemos ayudarnos mutuamente	Otro	
Localizado	N	31	0	1	5	5	19	2	3	6	2	73
	%	42,0%	0,0%	0,7%	6,5%	7,4%	26,5%	3,0%	4,2%	7,6%	2,3%	
Localizado y post. metástasis	N	14	1	0	5	7	10	3	6	5	0	51
	%	27,1%	1,0%	0,0%	10,6%	14,2%	20,1%	6,6%	10,9%	9,6%	0,0%	
Metástasis	N	17	1	1	9	7	22	9	8	8	0	80
	%	20,9%	0,6%	0,6%	11,5%	9,0%	26,9%	10,9%	10,2%	9,4%	0,0%	
Total	N	61	1	1	19	20	51	14	17	18	2	204

## Cambios en las amistades

		No ha habido ningún cambio	Distanciamiento de algunas amistades	Acercamiento de algunas amistades	Nuevas amistades	Relaciones con mayor confianza	Falta de comprensión y empatía en algunas amistades	Más oportunidades para estar con las amistades	Menos oportunidades para estar con las amistades	Otra	
Localizado	N	32	11	22	4	10	10	5	11	2	106
	%	30,2%	10,5%	20,9%	3,5%	9,2%	9,0%	4,6%	10,6%	1,6%	
Localizado y post. metástasis	N	10	6	9	2	6	2	4	7	0	46
	%	22,4%	12,6%	19,5%	4,7%	13,0%	4,7%	9,0%	14,1%	0,0%	
Metástasis	N	11	13	18	6	13	2	8	11	5	86
	%	12,7%	15,6%	20,9%	7,4%	14,7%	1,8%	9,0%	12,3%	5,7%	
Total	M	53	30	49	12	28	13	17	28	7	238

## Ayuda de ONG

		No me ayudó	Información sobre la enfermedad y tratamientos	Contactos con otros pacientes y familiares	Acceso a profesionales (psicología, trabajo social, abogados/as..)	Resolución de incidencias	Actividades de ocio	Hábitos saludables	Acompañamiento y reducción de miedos	Otra	
Localizado	Localizado	3	2	1	7	0	2	1	0	2	17
	%	18,8%	11,9%	6,0%	40,6%	0,0%	9,9%	3,0%	0,0%	9,9%	
Localizado y post. metástasis	Localizado y post. metástasis	1	2	1	6	3	0	0	0	2	14
	%	3,5%	15,3%	3,5%	38,8%	23,5%	0,0%	0,0%	0,0%	15,3%	
Metástasis	Metástasis	1	9	4	7	0	4	3	1	2	30
	%	3,3%	31,1%	12,2%	23,3%	0,0%	12,2%	10,6%	1,7%	5,5%	
Total	N	5	14	5	19	3	5	4	1	6	61

## Utilidad de ONG

**¿Crees que estar en contacto con una asociación de pacientes u ONG puede ayudarte o podría haberte sido útil en algún momento? \***

		Cáncer de pulmón localizado (tórax)	Cáncer de pulmón localizado (tórax) y posteriormente con metástasis (diseminado)	Cáncer de pulmón con metástasis (diseminado)	
Sí	Recuento	15	5	6	26
	%	32,6%	25,0%	19,4%	26,8%
	Residuos	1,2	-,2	-,1	
No	Recuento	2	1	10	13
	%	4,3%	5,0%	32,3%	13,4%
	Residuos	-,5	-,2	3,7	
No sé	Recuento	29	14	15	58
	%	63,0%	70,0%	48,4%	59,8%
	Residuos	,6	1,0	-,6	
Total	Recuento	46	20	31	97
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## 10. Datos destacados del análisis bivariado: variable "Haber o no fumador"

### Áreas afectadas por el cáncer de pulmón

	Haber sido fumador/a	N	Media	Desviación típ.	Error típ. media
Familia (relaciones, roles, dinámicas, etc.)	Sí	133	2,04	1,92306	,16695
	No	38	2,18	1,91568	,31136
Estado de ánimo / emocional / psicológico	Sí	133	2,99	1,50139	,13035
	No	40	3,30	1,54352	,24552
Planes de futuro	Sí	131	3,15	1,77512	,15539
	No	39	3,49	1,68166	,26921
Vida cotidiana (aficiones, amistades, responsabilidades, etc.)	Sí	133	2,59	1,75891	,15270
	No	40	3,15	1,71029	,27204

## Repercusiones emocionales

### Preocupación por mi familia

		Haber sido fumador/a		Total
		Sí	No	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	67	26	93
	% dentro de Haber sido fumador/a	50,4%	66,7%	54,1%
	Residuos corregidos	-1,8	1,8	
Sí, en más ocasiones	Recuento	55	11	66
	% dentro de Haber sido fumador/a	41,4%	28,2%	38,4%
	Residuos corregidos	1,5	-1,5	
No	Recuento	11	2	13
	% dentro de Haber sido fumador/a	8,3%	5,1%	7,6%
	Residuos corregidos	,7	-,7	
Total	Recuento	133	39	172
	% dentro de Haber sido fumador/a	100,0%	100,0%	100,0%

### Soledad

		Haber sido fumador/a		Total
		Sí	No	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	19	10	29
	% dentro de Haber sido fumador/a	14,3%	25,6%	16,9%
	Residuos corregidos	-1,7	1,7	
Sí, en más ocasiones	Recuento	41	15	56
	% dentro de Haber sido fumador/a	30,8%	38,5%	32,6%
	Residuos corregidos	-,9	,9	
No	Recuento	73	14	87
	% dentro de Haber sido fumador/a	54,9%	35,9%	50,6%
	Residuos corregidos	2,1	-2,1	
Total	Recuento	133	39	172
	% dentro de Haber sido fumador/a	100,0%	100,0%	100,0%

### Sentimiento de culpabilidad

		Haber sido fumador/a		Total
		Sí	No	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	24	4	28
	% dentro de Haber sido fumador/a	18,0%	10,3%	16,3%
	Residuos corregidos	1,2	-1,2	
Sí, en más ocasiones	Recuento	27	4	31
	% dentro de Haber sido fumador/a	20,3%	10,3%	18,0%
	Residuos corregidos	1,4	-1,4	
No	Recuento	82	31	113
	% dentro de Haber sido fumador/a	61,7%	79,5%	65,7%
	Residuos corregidos	-2,1	2,1	
Total	Recuento	133	39	172
	% dentro de Haber sido fumador/a	100,0%	100,0%	100,0%

### Incertidumbre

		Haber sido fumador/a		Total
		Sí	No	
Sí, con mucha frecuencia	Recuento	68	16	84
	% dentro de Haber sido fumador/a	51,1%	41,0%	48,8%
	Residuos corregidos	1,1	-1,1	
Sí, en más ocasiones	Recuento	64	20	84
	% dentro de Haber sido fumador/a	48,1%	51,3%	48,8%
	Residuos corregidos	-,3	,3	
No	Recuento	1	3	4
	% dentro de Haber sido fumador/a	0,8%	7,7%	2,3%
	Residuos corregidos	-2,5	2,5	
Total	Recuento	133	39	172
	% dentro de Haber sido fumador/a	100,0%	100,0%	100,0%

## Situaciones de mayor complejidad emocional

		Fase de diagnóstico, cuando se sospechaba la enfermedad	Pruebas de imagen antes del diagnóstico	Biopsia pulmonar	Momento de recibir el diagnóstico	Período entre diagnóstico e inicio de tratamiento	Tratamiento quirúrgico / médico	Ingresos hospitalarios	Convivencia con efectos secundarios	Noticia del avance de la enfermedad / recaída	Período tras la enfermedad (remisión)	Consultas de seguimiento médico	Otro		
Haber sido fumador/a	Sí	N	52	23	38	63	61	31	37	34	35	8	24	3	409
		%	12,7%	5,5%	9,4%	15,4%	15,0%	7,5%	9,0%	8,4%	8,5%	1,8%	6,0%	0,8%	
	No	N	16	9	12	27	14	9	17	9	16	2	10	1	140
		%	11,5%	6,2%	8,8%	19,5%	9,8%	6,1%	11,9%	6,3%	11,1%	1,2%	7,2%	0,4%	
Total		N	68	31	51	90	75	39	54	43	50	9	35	4	549